



| Resolución | N° 1088 | Fecha de aprobación | 20/09/2007 | Última actualización | 22/05/2019

## ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE CEBADILLA

Especie: Cebadilla Nombre científico: Bromus catharticus

### Parámetros

Campo	Prebásica - Básica	Niveles de tolerancia Certificada 1	Certificada 2
Años sin cultivos de Avena byzantina, Avena sativa, Avena strigosa, Bromus auleticus, Bromus catharticus, Bromus parodii, Festuca arundinacea, x Festulolium spp., Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium x hybridum.		2	2
Plantas fuera de tipo / 10 m²	1	1	10
Aislación (1) (metros)	3	3	3
Años máximos de cosecha (2)	2	2	2
Número mínimo de inspecciones	1	1	1

#### Observaciones:

Nota: para todas las categorías la siembra debe ser realizada en línea.

### Laboratorio

Peso máximo de lote (kg):

10.000

Peso mínimo de las muestras:

Muestra remitida (g):	400
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	20
Muestra de trabajo para determinación de otras semillas en número (g):	200

	1		
	Prebásica - Básica	Certificada 1	Certificada 2
Semilla pura (%)	96	96	96
Materia inerte (%)	4	4	4
Otras semillas (3) (%)	0.5	0.5	1
Número de semillas de malezas con tolerancia (4)	10	10	10
Número de semillas de otros cultivos (5) / muestra	10	10	40
Número de semillas de balango (6) y formas fatuoides (7) /muestra	3	3	10
Germinación	80	80	80

# Observaciones:

- (3) Se acepta como máximo 0.5% de malezas totales para todas las categorías.
- (4) Se consideran malezas toleradas: Ammi majus (biznaguilla), Ammi visnaga (biznaga), Carduus spp. (cardo), Carthamus lanatus (cardo de la cruz), Centaurea spp. (abrepuños), Cirsium vulgare (cardo negro), Convolvulus arvensis (corrigüela), Cynara cardunculus (cardo de castilla), Cyperus spp. (pasto bolita), Echium plantagineum (flor morada), Fallopia convolvulus (enredadera negra), Phalaris paradoxa (alpistillo), Plantago lanceolata (llantén), Rumex spp. (lengua de vaca), Silybum marianum (cardo mariano).
- (5) Otros cultivos: Avena byzantina, Avena sativa, Avena strigosa, Lolium hybridum, Lolium multiflorum, Lolium perenne.
- (6) Incluye: Avena barbata, Avena fatua, Avena sterilis.
- (7) Para las categorías Pre Básica, Básica y Certificada 1, el número de semillas de balango y formas fatuoides se consideran dentro del total de malezas con tolerancia.

Nota: se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: Coleostephus myconis (margarita de piria), Cuscuta spp. (cuscuta), Eragrostis plana (capin annoni), Senecio madagascariensis (senecio), Sorghum halepense (sorgo de alepo), Xanthium spp. (abrojo).

<sup>(1)</sup> Distancia mínima para evitar mezclas físicas en siembra y cosecha.

<sup>(2)</sup> Luego del segundo año de cosecha desciende de categoría, permitiendo un año más de cosecha de una categoría inferior. Los años de cosecha no podrán ser interrumpidos por más de un año de manera consecutiva.