

Resolución N° 700	Fecha de aprobación 12/07/2007	Última actualización 12/07/2007
----------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE COLZA**

Especie: Colza  
Nombre científico: *Brassica napus*

**Parámetros**
**Campo**

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de la misma especie)	5	3	3	-
Aislamiento de otros cultivos de <i>brassica</i> (1) (metros)	300	100	100	-
Plantas fuera de tipo / 1.000	1	3 (C1) y 5 (C2)	5	-
Plantas de otras especies de brassica / 1.000	0.2	0.2 (C1) y 0.5 (C2)	0.5	-
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	-

**Observaciones:**

(1) En especies autóгамas separación suficiente como para evitar mezcla física a la cosecha.

**Laboratorio**

Peso máximo de lote (kg):	10.000
Peso mínimo de las muestras:	
Muestra remitida (g):	150
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	10
Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g):	100

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Semilla pura (%)	97	97	97	97
Materia inerte (%)	3	3	3	3
Otras semillas (%)	0.2	0.2	0.2	0.2
Semillas de malezas con tolerancia (2) / muestra	1	1 (C1) y 2 (C2)	2	2
Semillas de otras especies de <i>brassica</i> spp. / (3) muestra	3	3 (C1) y 5 (C2)	5	5
Germinación (%)	80 (4)	80	80	80

**Observaciones:**

**Se consideran malezas de tolerancia cero para todas las especies:** abrojo (*Xanthium* spp.), capin annoni (*Eragrostis plana*), cuscuta (*Cuscuta* spp.), margarita de piria (*Coleostephus myconis*), senecio (*Senecio madagascariensis*), sorgo de alepo (*Sorghum halepense*).

(2) **Se consideran malezas toleradas para todas las especies de cultivos de invierno:** alpistillo (*Phalaris paradoxa*), apio cimarrón (*Cyclospermum leptophyllum*), balango (*Avena fatua*), biznaga (*Ammi visnaga*), biznaguilla (*Ammi majus*), cardos (*Carduus* spp., *Cynara cardunculus*, *Sylibum marianum*, *Carthamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Centaurea* spp.), corrigüela (*Convolvulus* spp.), enredadera negra (*Fallopia convolvulus*), flor morada (*Echium plantagineum*), joyo (*Lolium temulentum*), lengua de vaca (*Rumex* spp.), llantén (*Plantago lanceolata*), manzanilla (*Anthemis cotula*), mostacilla (*Rapistrum rugosum*), nabo (*Brassica* spp.), pasto bolita (*Cyperus rotundus*), rábano (*Raphanus* spp.), trébol de olor (*Melilotus indicus*)

(3) La determinación de número de semillas de *Brassica* spp. se hará sobre la muestra de trabajo para análisis de pureza física.

(4) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE.

No se permitirá la producción y/o comercialización de semillas de colza con más de 0.2% de ácido erúico.