

| Resolución | Fecha de aprobación | Última actualización |
|------------|---------------------|----------------------|
| N° 1088    | 20/09/2007          | 22/05/2019           |

## ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE DACTYLIS

Especie: Pasto ovillo / Pasto azul  
Nombre científico: *Dactylis glomerata*

### Parámetros

#### Campo

Años sin cultivo de *Dactylis glomerata*,  
*Festuca arundinacea*, *Holcus lanatus*,  
*Lolium multiflorum*, *Lolium perenne*,  
*Lolium x hybridum*, *Phalaris aquatica*,  
*x Festulolium* spp.

|                                                        | Prebásica - Básica | Niveles de tolerancia<br>Certificada 1 | Certificada 2 |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| Aislación de cultivos de la misma especie (metros) (1) | 100                | 100                                    | 50            |
| Plantas fuera de tipo / 10 m <sup>2</sup>              | 1                  | 1                                      | 10            |
| Plantas de raigrás / 10 m <sup>2</sup> (2)             | 0.5                | 1                                      | 2             |
| Número mínimo de inspecciones (3)                      | 1                  | 1                                      | 1             |
| Número máximo de cosechas (años) (4)                   | 5                  | 5                                      | 5             |

#### Observaciones:

(1) Se pueden considerar otras opciones de aislamiento como remoción de bordes hasta lograr la distancia requerida a la fuente de contaminación; barreras naturales; barreras artificiales; etc.

(2) Incluye: *Lolium multiflorum*, *Lolium perenne*, *Lolium x hybridum*.

(3) En las inspecciones de campo se observa la frecuencia y presencia de *Bromus* spp., *Festuca* spp., *Holcus* spp., *Phalaris* spp., a fin de hacer las recomendaciones correspondientes.

(4) Luego de la quinta cosecha desciende de categoría, permitiendo dos años más de cosecha de una categoría inferior.

Notas: los años de inscripción no podrán ser interrumpidos por más de un año consecutivo.

Para todas las categorías la siembra debe ser realizada en línea.

#### Laboratorio

Peso máximo de lote (kg): 10.000

Peso mínimo de las muestras:

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Muestra remitida (g):                                                  | 300 |
| Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):                 | 3   |
| Muestra de trabajo para determinación de otras semillas en número (g): | 30  |

|                                                            | Prebásica - Básica | Niveles de tolerancia<br>Certificada 1 | Certificada 2 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| Semilla pura (%)                                           | 90                 | 90                                     | 90            |
| Materia inerte (%)                                         | 10                 | 10                                     | 10            |
| Otras semillas (%) (5)                                     | 0.5                | 1                                      | 3             |
| Número de semillas de malezas con tolerancia / muestra (6) | 10                 | 15                                     | 25            |
| Germinación                                                | 75                 | 75                                     | 75            |

#### Observaciones:

(5) Se aceptará como máximo 0.5% de malezas totales para todas las categorías.

(6) Se consideran malezas toleradas: *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Carduus* spp. (cardo), *Carthamus lanatus* (cardo de la cruz), *Centaurea* spp. (abrepunhos), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Convolvulus arvensis* (corrigüela), *Cynara cardunculus* (cardo de castilla), *Cyperus* spp. (pasto bolita), *Echium plantagineum* (flor morada), *Fallopia convolvulus* (enredadera negra), *Phalaris paradoxa* (alpistillo), *Plantago lanceolata* (llantén), *Rumex* spp. (lengua de vaca), *Silybum marianum* (cardo mariano).

Nota: se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de piria), *Cuscuta* spp. (cuscuta), *Eragrostis plana* (capinannoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).