

Resolución	Fecha de aprobación	Última actualización
N° 700	12/07/2007	09/02/2023

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE COLZA

Nombre común: Colza, Nabo, Nabo forrajero, Canola
Nombre científico: *Brassica napus*

Parámetros
Campo

	Prebásica - Básica	Niveles de tolerancia		Comercial A
		Certificada C1	Certificada C2	
Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de la misma especie)	5	3	3	3
Aislamiento de otros cultivos de <i>brassica</i> (metros) (1)	300	100	100	100
Plantas fuera de tipo / 1.000	1	3	5	5
Plantas de otras especies de brassica / 1.000	0.2	0.2	0.5	0.5
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	1

Observaciones:

(1) En especies autóгамas separación suficiente como para evitar mezcla física a la cosecha.

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg):	10.000
Peso mínimo de las muestras:	
Muestra remitida (g):	150
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	10
Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g):	100
Muestra de trabajo para determinación de eventos transgénicos (g):	6

	Prebásica - Básica	Niveles de tolerancia		Comercial A y B
		Certificada C1	Certificada C2	
Semilla pura (%)	97	97	97	97
Materia inerte (%)	3	3	3	3
Otras semillas (%)	0.2	0.2	0.2	0.2
Semillas de malezas con tolerancia / muestra (2)	1	1	2	2
Semillas de otras especies de <i>Brassica</i> spp. / muestra (3)	3	3	5	5
Germinación (%)	80 (4)	80	80	80
Presencia de eventos transgénicos (5)	0	0	0	0

Observaciones:

Se consideran malezas de tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de piria), *Cuscuta* spp. (*cuscuta*), *Eragrostis plana* (capínannoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).

(2) Se consideran malezas toleradas para *Brassica napus*: *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Avena fatua* (balango), *Carduus* spp. (cardos), *Cynara cardunculus* (cardo de castilla), *Silybum marianum* (cardo mariano), *Carthamus lanatus* (cardo cruz), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Centaurea* spp. (abrepunhos), *Convolvulus* spp. (corrigüela), *Cyclosporum leptophyllum* (apio cimarrón), *Cyperus rotundus* (pasto bolita), *Echium plantagineum* (flor morada), *Fallopia convolvulus* (enredadera negra), *Lolium temulentum* (joyo), *Melilotus indicus* (trébol de olor), *Phalaris paradoxa* (alpistillo), *Plantago lanceolata* (llantén), *Rapistrum rugosum* (mostacilla), *Raphanus* spp. (rábano), *Rumex* spp. (lengua de vaca).

(3) La determinación del número de semillas de otras especies de *Brassica* spp. se hará sobre la muestra de trabajo para análisis de pureza física.

(4) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE.

(5) La detección de eventos transgénicos deberá ser realizada por el Laboratorio de Análisis de Semillas de INASE Uruguay (LOAS) o por laboratorios validados por el LOAS (metodología de análisis: protocolos JRC).

Nota: no se permitirá la producción y/o comercialización de semillas de *Brassica napus* con más de 0.2% de ácido erúico.