

Acta N° 850	Fecha de aprobación 02/04/2021	Última actualización 02/04/2021
----------------	-----------------------------------	------------------------------------

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE FESTULOLIUM

Especie: **Festulolium**
Nombre científico: **x Festulolium**

Parámetros
Campo

	Niveles de tolerancia		
	Prebásica - Básica	Certificada 1	Certificada 2
Años sin cultivo de: <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Festuca arundinacea</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Lolium perenne</i> , <i>Lolium x hybridum</i> , <i>Phalaris aquatica</i> , x <i>Festulolium</i>	3	3	2
Aislación (metros) (1)	100	100	50
Plantas fuera de tipo / 10 m ²	1	1	10
Número mínimo de inspecciones	1	1	1

Observaciones:

(1) Se pueden considerar otras opciones de aislamiento como remoción de bordes hasta lograr la distancia requerida a la fuente de contaminación; barreras naturales; barreras artificiales; etc.

Nota: para todas las categorías la siembra debe ser realizada en línea, tapando un surco en un extremo o en la mitad de la sembradora de manera que quede un surco sin sembrar por pasada, fundamental para determinar la contaminación con raigrás espontáneo en el campo.

Laboratorio:

Peso máximo del lote (kg):	10.000
Peso mínimo de las muestras:	
Muestra remitida (g):	300
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	6
Muestra de trabajo para determinación de otras semillas en número (g):	60

	Niveles de tolerancia		
	Prebásica - Básica	Certificada 1	Certificada 2
Semilla pura (%)	97	97	97
Materia inerte (%)	3	3	3
Otras semillas (%) (2)	1	1	3
Número de semillas de malezas con tolerancia / muestra (3)	10	15	25
Germinación	80	80	80

Observaciones:

(2) Se aceptará como máximo 0,5% de malezas totales para todas las categorías.

(3) **Se consideran malezas toleradas:** *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Avena barbata*, *Avena fatua*, *Avena sterilis*, (balangos y formas fatuoides) *Carduus* spp. (cardo), *Carthamus lanatus* (cardo de la cruz), *Centaurea* spp. (abrepuños), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Convolvulus arvensis* (corrigüela), *Cyclospermum leptophyllum* (apio cimarrón), *Cynara cardunculus* (cardo de castilla) *Cyperus* spp., *Echium plantagineum* (flor morada), *Fallopia convolvulus* (enredadera negra), *Lolium temulentum* (joyo), *Melilotus indicus* (trébol de olor), *Phalaris paradoxa* (alpistillo), *Plantago lanceolata* (llantén), *Raphanus* spp. (rábano), *Rapistrum rugosum* (mostacilla), *Rumex* spp. (lengua de vaca), *Silybum marianum* (cardo mariano).

Nota: se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de piria), *Cuscuta* spp. (*Cuscuta*), *Eragrostis plana* (capínannoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).