

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE CEBADA

| | |
|--|------------------------|
| Especie: | cebada |
| Nombre científico: | <i>Hordeum Vulgare</i> |
| Peso máximo de lote (kg): | 30.000 |
| Peso mínimo de las muestras: | |
| Muestra remitida (g): | 1.500 |
| Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g): | 120 |
| Muestra de trabajo para determinación de otras semillas (g): | 1.000 |

| Parámetros | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Campo | Niveles de tolerancia por categoría | | | |
| | Prebásica-Básica | Certificada (C1 y C2) | Comercial A | Comercial B |
| Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de cereales de invierno) | 1 | 1 | 1 | - |
| Espigas fuera de tipo/ 1.000 espigas | 1 | 3 (C1) y 5 (C2) | 5 | - |
| Panojas y/o espigas de otros cultivos/ 1.000 espigas (1) | 0.2 | 0.2 (C1) y 0.5 (C2) | 0.5 | - |
| Número mínimo de inspecciones | 1 | 1 | 1 | - |
| Laboratorio | | | | |
| Semilla pura (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Materia inerte (%) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Otras semillas (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Semillas de malezas con tolerancia (2)/ muestra | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Semillas de otros cultivos/ muestra (1) | 4 | 4 (C1) y 10 (C2) | 10 | 10 |
| Germinación (%) | 85 (3) | 85 | 85 | 85 |

Observaciones:

Aislación: Distancia suficiente como para evitar mezclas varietales en siembra y cosecha.

(1) Otros cultivos para cebada son: avena (*Avena sativa* y *Avena strigosa*), centeno (*Secale cereale*), trigo (*Triticum aestivum*), trigo candeal (*Triticum durum*), triticale (*X Triticosecale*).

Se consideran malezas de tolerancia cero para todas las especies: abrojo (*Xanthium* spp.), capin annoni (*Eragrostis plana*), cuscuta (*Cuscuta* spp.), margarita de piria (*Coleostephus myconis*), senecio (*Senecio madagascariensis*), sorgo de alepo (*Sorghum halepense*).

(2) Se consideran malezas toleradas para todas las especies de cultivos de invierno: alpastillo (*Phalaris paradoxa*), apio cimarrón (*Cyclosporum leptophyllum*), balango (*Avenua fatua*), biznaga (*Ammi visnaga*), biznaguilla (*Ammi majus*), cardos (*Carduus* spp., *Cynara cardunculus*, *Sylibum marianum*, *Carthamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Centaurea* spp.), corrigüela (*Convolvulus* spp.), enredadera negra (*Fallopia convolvulus*), flor morada (*Echium plantagineum*), joyo (*Lolium temulentum*), lengua de vaca (*Rumex* spp.), llantén (*Plantago lanceolata*), manzanilla (*Anthemis cotula*), mostacilla (*Rapistrum rugosum*), nabo (*Brassica* spp.), pasto bolita (*Cyperus rotundus*), rábano (*Raphanus* spp.), trébol de olor (*Melilotus indicus*).

(3) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE.