ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE LOTONONIS

Especie:	Lotononis
Nombre científico:	*Lotononis bainesii*

Parámetros

Campo

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	**Certificada (C1 y C2)**	**Comercial A**	**Comercial B**
Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de *Lotononis*)	3	3 (C1) y 2 (C2)	2	-
Aislamiento de cultivos con *Lotononis* (metros) **(1)**	200	50	50	-
Plantas fuera de tipo / 10 m²	1	1 (C1) y 10 (C2)	10	-
Número máximo de cosechas **(2)**	2	2 (C1) y 3 (C2)	3	-
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	-

Observaciones:
Se dejará una franja de 100 m sin sembrar en una parte de la chacra para facilitar la inspección.
(1) En chacras menores a 2 ha la aislación será de 200 m en todas las categorías.
(2) En las categorías prebásica, básica y C1, al tercer año se baja de categoría.

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg): 10.000

Peso mínimo de las muestras:

Muestra remitida (g):	100
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	1
Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g):	10

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	**Certificada (C1 y C2)**	**Comercial A**	**Comercial B**
Semilla pura (%)	90	90	90	90
Materia inerte (%)	10	10	10	10
Otras semillas (%) **(3)**	1	1 (C1) y 5 (C2)	5	5
Germinación (%)	75 (4)	75	75	75

Observaciones:
(3) Se aceptará como máximo 1% de malezas totales y no más de 0.5% de malezas toleradas para todas las categorías.
Se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de piria), *Cuscuta* spp. (cuscuta), *Eragrostis plana* (capin annoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).
Se consideran malezas toleradas para lotononis: *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Cirsium vulgare, Carduus* spp. y *Centaurea* spp. (cardos), *Cyperus* spp. (pasto bolita), *Rumex* spp. (lengua de vaca).
(4) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE.
En las inspecciones de campo se observará la presencia de *Trifolium repens* (trébol blanco) y *Lotus subbiflorus* (lotus rincón) a fin de hacer las recomendaciones correspondientes.
La muestra de trabajo para la determinación de *Cuscuta* spp. será de 100 g.