



| Resolución | Fecha de aprobación | Última actualización | 20/09/2007 | 22/05/2019

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE FESTUCA

Especie: Festuca
Nombre científico: Festuca arundinacea

Parámetros			
Campo	Prebásica - Básica	Niveles de tolerancia Certificada 1	Certificada 2
Años sin cultivo de <i>Dactylis glomerata</i> , Festuca arundinacea, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium x hybridum, Phalaris aquatica, x Festulolium spp.	3	3	2
Aislación (metros) (1)	100	100	50
Plantas fuera de tipo / 10 m²	1	1	10
Plantas de raigrás / 10 m² (2)	0.5	1	2
Número mínimo de inspecciones (3)	1	1	1
Número máximo de cosechas (años) (4)	5	5	5

Observaciones:

- (1) Se pueden considerar otras opciones de aislamiento como remoción de bordes hasta lograr la distancia requerida a la fuente de contaminación; barreras naturales; barreras artificiales; etc.
- (2) Incluye: Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium x hybridum.
- (3) En las inspecciones de campo se observa la frecuencia y presencia de *Bromus* spp., *Dactylis* spp., *Phalaris* spp., a fin de hacer las recomendaciones correspondientes.
- (4) Luego de la quinta cosecha desciende de categoría, permitiendo dos años más de cosecha de una categoría inferior.

Notas: los años de inscripción del semillero no podrán ser interrumpidos por más de un año consecutivo.

Para todas las categorías la siembra debe ser realizada en línea.

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg):

10.000

Peso mínimo de las muestras:

Muestra remitida (g):	300
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	5
Muestra de trabajo para determinación de otras semillas en número (g):	50

	N	I	
	Prebásica - Básica	Certificada 1	Certificada 2
Semilla pura (%)	95	95	95
Materia inerte (%)	5	5	5
Otras semillas (%) (5)	0.5	1	3
Número de semillas de malezas con tolerancia / muestra (6)	10	15	25
Germinación	75	75	75

Observaciones:

(5) Se aceptará como máximo 0.5% de malezas totales para todas las categorías y 0.5% de Lolium spp. en Certificada 1.

(6) Se consideran malezas toleradas: Ammi majus (biznaguilla), Ammi visnaga (biznaga), Carduus spp. (cardo), Carthamus lanatus (cardo de la cruz), Cirsium vulgare (cardo negro), Centaurea spp. (abrepuños), Convolvulus arvensis (corrigüela), Cynara cardunculus (cardo de castilla), Cyperus spp. (pasto bolita), Echium plantagineum (flor morada), Fallopia convolvulus (enredadera negra), Phalaris paradoxa (alpistillo), Plantago lanceolata (llantén), Rumex spp. (lengua de vaca), Silybum marianum (cardo mariano).

Nota: se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: Coleostephus myconis (margarita de piria), Cuscuta spp. (cuscuta), Eragrostis plana (capin annoni), Senecio madagascariensis (senecio), Sorghum halepense (sorgo de alepo), Xanthium spp. (abrojo).