

| | | |
|------------|---------------------|----------------------|
| Resolución | Fecha de aprobación | Última actualización |
| N° 949 | 29/10/2008 | 01/06/2020 |

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE SUDANGRÁS

Especie: Sudangrás
 Nombre científico: *Sorghum x drummondii*

Parámetros
Campo

| | Niveles de tolerancia | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | Prebásica - Básica | Certificada 1 | Certificada 2 |
| Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de sorgo) (1) | 1 | 1 | 1 |
| Aislamiento de cultivos o mejoramientos con sorgo (metros) | 400 | 200 | 200 |
| Plantas fuera de tipo / 1.000 | 0.4 | 1 | 1 |
| Número mínimo de inspecciones | 1 | 1 | 1 |

Observaciones:

(1) Para todas las categorías se puede repetir el cultivo al año siguiente, siempre que sea el mismo cultivar y de igual o inferior categoría.

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg):

10.000

Peso mínimo de las muestras:

| | |
|--|-----|
| Muestra remitida (g): | 250 |
| Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g): | 25 |
| Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g): | 250 |

| | Niveles de tolerancia | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|
| | Prebásica - Básica | Certificada 1 | Certificada 2 |
| Semilla pura (%) | 98 | 98 | 98 |
| Materia inerte (%) | 2 | 2 | 2 |
| Otras semillas (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Número de semillas de otros cultivos (2) / muestra | 6 | 6 | 6 |
| Número de semillas de otras especies de sorgo / muestra | 3 | 3 | 3 |
| Número de semillas de malezas con tolerancia (3) / muestra | 10 | 10 | 10 |
| Germinación (%) | 75 | 75 | 75 |

Observaciones:

(2) Otros cultivos para sudangrás son: moha, pasto italiano.

Se consideran malezas toleradas para sudangrás: capín (*Echinochloa* spp.), cardos (*Carduus* spp., *Cynara cardunculus*, *Sylibum marianum*, *Carthamus lanatus*, *Cirsium vulgare*, *Centaurea* spp.), cola de zorro (*Setaria geniculata*), flor morada (*Echium plantagineum*), ipomoea (*Ipomoea grandiflora*), pasto blanco (*Digitaria sanguinalis*), pasto bolita (*Cyperus rotundus*).

(3) Se consideran malezas con tolerancia cero en la muestra: abrojo (*Xanthium* spp.), capin annoni (*Eragrostis plana*), cuscuta (*Cuscuta* spp.), margarita de piria (*Coleostephus myconis*), senecio (*Senecio madagascariensis*), sorgo de alepo (*Sorghum halepense*).

En las inspecciones de campo se observará la presencia de otros cultivos de verano (soja, maíz o girasol) y de otras especies de sorgo a fin de hacer las recomendaciones correspondientes.