

Resolución	Fecha de aprobación	Última actualización
N° 1529	30/01/2006	22/11/2006

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE LOTUS ULIGINOSUS / LOTUS PEDUNCULATUS

Especie: Lotus uliginosus / L. pedunculatus
Nombre científico: Lotus uliginosus / L. pedunculatus

Parámetros
Campo

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Rotación (ciclos agrícolas sin cultivo de Lotus spp.)	3	3 (C1) y 2 (C2)	2	-
Aislamiento de cultivos o mejoramientos con Lotus uliginosus / L. pedunculatus (metros) (1)	200	50	50	-
Plantas fuera de tipo / 10 m ²	1	1 (C1) y 8 (C2)	8	-
Plantas de Lotus subbiflorus / 10 m ²	0.5	0.5 (C1) y 5 (C2)	5	-
Número máximo de cosechas (2)	2	2 (C1) y 3 (C2)	3	-
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	-

Observaciones:

Se dejará una franja de 100 m sin sembrar en una parte de la chacra para facilitar la inspección.

(1) En chacras menores a 2 ha la aislación será de 200 m en todas las categorías.

(2) En las categorías prebásica, básica y C1, se baja de categoría al tercer año.

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg): 10.000

Peso mínimo de las muestras:

Muestra remitida (g): 300
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g): 2
Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g): 20

	Niveles de tolerancia			
	Prebásica - Básica	Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Semilla pura (%)	95	95	95	90
Materia inerte (%)	5	5	5	5
Otras semillas (%) (3)	0.6	0.6 (C1) y 5 (C2)	5	10
Número de semillas de malezas con tolerancia / muestra (4)	20	20 (C1)	-	-
Número de semillas de otros cultivos/ muestra (5)	40	40	40	-
Germinación (%)	75 (6)	75	75	75

Observaciones:

(3) Se aceptará como máximo 0.5% de malezas totales para todas las categorías. En las categorías C2, Comercial A y B, no más de 0.1% de malezas toleradas.

Se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: Coleostephus myconis (margarita de piria), Cuscuta spp. (cuscuta), Eragrostis plana (capinannoni), Senecio madagascariensis (senecio), Sorghum halepense (sorgo de alepo), Xanthium spp. (abrojo).

(4) Se consideran malezas toleradas para Lotus uliginosus / L. pedunculatus: Ammi majus (biznaguilla), Ammi visnaga (biznaga), Carduus spp., Centaurea spp. y Cirsium vulgare (cardos), Cyperus spp. (pasto bolita), Rumex spp. (lengua de vaca).

(5) Otros cultivos para Lotus uliginosus / L. pedunculatus son: Lotus subbiflorus y Trifolium repens. La determinación se hará en la muestra de trabajo para análisis de pureza física. En la categoría Comercial B se permitirá la comercialización de semilla con hasta un 10% de semillas de otros cultivos.

(6) La comercialización con menor germinación podrá ser realizada con el conocimiento del usuario y la autorización de INASE. En las inspecciones de campo se observará la presencia de Trifolium repens (trébol blanco), Lotus corniculatus y Lotus tenuis a fin de hacer las recomendaciones correspondientes.

La muestra de trabajo para la determinación de Cuscuta spp. será de 200 g.