

Acta N° 766	Fecha de aprobación 07/08/2020	Última actualización 07/08/2020
----------------	-----------------------------------	------------------------------------

ESTÁNDAR ESPECÍFICO DE VICIA FORRAJERA

Especie: Vicia forrajera
 Nombre científico: *Vicia benghalensis*, *Vicia villosa*, *Vicia sativa*

Parámetros
Campo

	Prebásica - Básica	Niveles de tolerancia		
		Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Años sin cultivo de: <i>Vicia</i> spp. (1)	3	3 (C1) – 2 (C2)	2	-
Aislación (metros) (2)	200	100 (C1) – 50 (C2)	50	-
Número de plantas fuera de tipo / 10 m ²	0.3	1	1	-
Número de plantas de otros cultivos / 10 m ² (3)	0.3	1	1	-
Número mínimo de inspecciones	1	1	1	-

Observaciones:

- (1) Se permite la siembra durante dos ciclos de cultivos seguidos de la misma especie y cultivar, cosechando una categoría inferior a la del primer ciclo.
 (2) Para *Vicia benghalensis* la distancia mínima de aislación se reduce a 3 metros.
 (3) Se consideran otros cultivos aquellas especies de vicia diferentes a la sembrada.

Laboratorio

Peso máximo de lote (kg):	30.000
Peso mínimo de las muestras:	
Muestra remitida (g):	1.000
Muestra de trabajo para análisis de pureza física (g):	
<i>Vicia benghalensis</i> L.	120
<i>Vicia sativa</i> L.	140
<i>Vicia villosa</i> Roth	100
Muestra de trabajo para determinación en número de otras semillas (g):	1.000

	Prebásica - Básica	Niveles de tolerancia		
		Certificada (C1 y C2)	Comercial A	Comercial B
Semilla pura (%)	98	98	98	98
Materia inerte (%)	2	2	2	2
Otras semillas (%) (4)	1	1	1	1
Número de semillas de <i>Rumex</i> spp. / muestra	5	5	5	5
Germinación	85	85	85	85

Observaciones:

(4) Se acepta como máximo 0,5 % de malezas totales y 0,3 % de malezas con tolerancia para todas las categorías.
Se consideran malezas toleradas: *Ammi majus* (biznaguilla), *Ammi visnaga* (biznaga), *Anthemis cotula* (manzanilla), *Avena barbata*, *Avena fatua*, *Avena sterilis* (balangos y formas fatuoides), *Carduus* spp. (cardo), *Carthamus lanatus* (cardo de la cruz), *Centaurea* spp. (abrepuños), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Convolvulus arvensis* (corrigüela), *Cyclosporum leptophyllum* (apio cimarrón), *Cynara cardunculus* (cardo de castilla), *Cyperus* spp. (pasto bolita), *Echium plantagineum* (flor morada), *Fallopia convolvulus* (enredadera negra), *Lolium temulentum* (joyo), *Melilotus indicus* (trébol de olor), *Phalaris paradoxa* (alpistillo), *Plantago lanceolata* (llantén), *Raphanus* spp. (rábano), *Rapistrum rugosum* (mostacilla), *Silybum marianum* (cardo mariano).

Nota: se consideran malezas con tolerancia cero para todas las especies: *Coleostephus myconis* (margarita de piria), *Cuscuta* spp. (Cuscuta), *Eragrostis plana* (capín annoni), *Senecio madagascariensis* (senecio), *Sorghum halepense* (sorgo de alepo), *Xanthium* spp. (abrojo).